

## ¿Qué debo saber sobre el COVID-19 y la vacuna contra el COVID-19 si estoy inmunocomprometido?



Contraer COVID-19 puede ser más **peligroso** para ti que para otras personas.



Puedes no tener **suficiente protección** de una serie de vacunación COVID-19 de dos dosis.



Una **tercera dosis** puede aumentar tus defensas contra el COVID-19.

## Recomendaciones de una dosis extra

Una dosis extra es recomendada para personas que están inmunocomprometidas moderada o severamente. Esto incluye personas que:

- Han estado recibiendo tratamiento activo para cáncer por tumores o cánceres de la sangre.
- Han recibido un trasplante de órgano y están tomando medicamentos para suprimir el sistema inmune.
- Recibió un trasplante de células madre en los últimos 2 años o está tomando medicina para inhibir el sistema inmunológico.
- Inmunodeficiencia primaria moderada o grave (como el síndrome de DiGeorge, el síndrome de Wiskott-Aldrich).
- Infección por VIH avanzada o no tratada.
- Tratamiento activo con dosis altas de corticosteroides u otras drogas que puede inhibir su sistema inmunológico respuesta.



Américas es una organización centrada en la salud y el desarrollo que responde a las personas afectadas por la pobreza o desastres, con programas de salud, medicamentos, suministros médicos y ayuda de emergencia que cambian la vida.

## Respuestas a la Vacuna COVID-19 para



## Personas con un Sistema Inmune Debilitado



Si estoy inmunocomprometido, ¿debería ponerme la vacuna COVID-19?

Las personas inmunocomprometidas deben recibir la vacuna contra COVID-19. Contraer COVID-19 puede ser más peligroso para usted que para otras personas.

¿Funcionará una vacuna COVID-19 con mi sistema inmunológico?

Algunas personas inmunocomprometidas tienen una buena respuesta inmunitaria a las vacunas. Pero es posible que no obtenga una respuesta tan fuerte a la vacuna como otras personas. En algunos casos, es posible que deba recibir una dosis adicional de una vacuna para mejorar las defensas de su cuerpo.

¿Es una dosis extra lo mismo que una inyección de refuerzo?

No. Una **dosis de refuerzo** se administra cuando la protección de una persona desaparece con el tiempo. Las personas inmunocomprometidas a veces no obtienen esa protección en primer lugar. Necesitan una **dosis extra** al principio para poner en marcha sus defensas.

**¡SÍ!**



## ¿Cómo sé si necesito una dosis adicional de la vacuna contra el COVID-19?

Debe marcar dos casillas para obtener una tercera dosis.

Has recibido las **dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, ya fuera Pfizer o Moderna.**

Debe **hablar con su médico sobre su condición.** Pregunte si necesita recibir una dosis adicional. *Consulta el reverso para conocer la elegibilidad de la tercera dosis.*



## ¿Cuáles son los beneficios de una dosis extra?

Una dosis adicional puede evitar que te enfermes gravemente a causa del COVID-19. También reduce las posibilidades de morir a causa de la enfermedad. Algunos datos muestran que las personas inmunocomprometidas obtienen protección con una dosis adicional de la misma vacuna. Tú quieres tener la mayor protección posible.



## ¿Cuáles son los riesgos de una dosis extra?

Los expertos continúan atentos a los efectos secundarios de las vacunas. Lo mismo ocurre con estas dosis adicionales. Hasta ahora, los efectos secundarios de la tercera dosis de ARNm han sido los mismos que los de la serie de dos dosis: principalmente dolor en el brazo y cansancio. Estos efectos secundarios son en su mayoría leves. Se van en unos días.

Sin embargo, al igual que con la serie de dos dosis, los efectos secundarios son raros, pero pueden ocurrir.


Si necesitas una dosis adicional de la vacuna COVID-19 de Pfizer o Moderna, debe recibirla al menos 28 días después de su segunda dosis. Intenta recibir una tercera dosis de la misma vacuna. Si no sabes qué vacuna tomó o si no está disponible, puedes usar la vacuna de ARNm COVID-19.

## Contraer COVID-19 puede ser peligroso para personas inmunocomprometidas

Las personas inmunocomprometidas de moderada a grave constituyen aproximadamente el 3% de la población adulta. Si pertenece a este grupo, contraer COVID-19 podría ser muy malo para usted y para quienes lo rodean.

Las personas inmunocomprometidas de moderada a grave tienen un mayor riesgo de:

- ⚠ **Enfermarse de COVID-19 durante mucho tiempo**
- ⚠ **Estar en el hospital por COVID-19**
- ⚠ **Transmitir COVID-19 a las personas que los rodean**
- ⚠ **Tener una infección posvacunación**



**Vacunarse completamente contra COVID-19 (tal vez con una dosis adicional) puede reducir todos estos riesgos.**



**Planifica recibir tu vacuna contra el COVID-19 en [www.vaccines.gov](http://www.vaccines.gov).**

Relieve de responsabilidad: Este proyecto fue financiado en parte por un acuerdo de cooperación con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades con el número de subvención 1 NU50CK000588-01-00. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades son una agencia dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). El contenido de este centro de recursos no representa necesariamente la política de los CDC o del HHS y no debe considerarse un respaldo del Gobierno Federal.