

Cuándo vacunarse o ponerse refuerzo contra el COVID-19:


Para la mayoría de las personas

(No para personas con sistemas inmunitarios muy débiles)

NOVEDADES


Niños 6 meses a 4 años

Moderna



0

Pfizer-BioNTech



Niños de 5 a 11 años

Moderna




0

Pfizer-BioNTech



Personas de 12 años o más


Moderna, Novavax, or Pfizer-BioNTech



Para leer más sobre los detalles clínicos de la administración de estas vacunas, consulte:

- [Cuidado de los pacientes con COVID-19](#)
- [Dosis de la vacuna COVID-19 y colores de la tapa](#)
- [Uso de las vacunas COVID-19](#)

Personas de 18 años o más que se hayan vacunado por primera vez con la vacuna J&J.†



*Todas las personas de 12 años o más pueden recibir una dosis de refuerzo bivalente al menos 2 meses después de haber:

- terminado su serie primaria o
- la última dosis de refuerzo, lo que ocurra primero


† La vacuna de J&J sólo debe utilizarse en condiciones especiales. Lea aquí: <https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/interim-considerations-us-appendix.html#appendix-a>

Cuándo vacunarse o ponerse refuerzo contra el COVID-19: Para personas con sistemas inmunitarios muy débiles

NOVEDADES

Niños 6 meses a 4 años

Moderna




Pfizer-BioNTech




Niños de 5 a 11 años

Moderna




Pfizer-BioNTech




Personas de 12 años o más


Moderna o Pfizer-BioNTech



Novavax



Personas de 18 años o más que se hayan vacunado por primera vez con la vacuna J&J[†]



*Todas las personas de 12 años o más pueden recibir una dosis de refuerzo bivalente al menos 2 meses después de haber:

- terminado su serie primaria o
- la última dosis de refuerzo, lo que ocurra primero

† La vacuna de J&J sólo debe utilizarse en condiciones especiales. Lea aquí: <https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/interim-considerations-us-appendix.html#appendix-a>