

UNMASK THE FACTS

9 de mayo – 22 de mayo

20 de mayo de 2022

Recomiendan dosis de refuerzo COVID-19 para niños de 5 a 11 años

Los CDC recomiendan que todos los niños de entre 5 y 11 años reciban una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer-BioNTech al menos 5 meses después de haber completado la serie primaria. Ahora se recomienda a todas las personas de más de 5 años que reciban el primer refuerzo después de que haya transcurrido cierto tiempo (2 meses para los receptores de J&J, 3 meses para las personas inmunodeprimidas de 5 años o más, y 5 meses para todos los demás).

[LEA MÁS >](#)

17 de mayo de 2022

Ya se puede solicitar una tercera ronda de pruebas caseras de COVID-19

Los hogares en EE. UU. y sus territorios pueden solicitar ahora otras ocho pruebas gratuitas a domicilio en [COVIDTests.gov](https://www.covidtests.gov), lo que eleva a 16 el número total de pruebas gratuitas disponibles para cada hogar desde el inicio del programa. A medida que las subvariantes altamente transmisibles de Omicron impulsan un aumento de casos en algunas partes del país, la Casa Blanca cree que las pruebas gratuitas y accesibles ayudarán a frenar la propagación del virus.

[LEA MÁS >](#)

13 de mayo de 2022

300,000 muertes por COVID-19 podrían haberse evitado con la vacunación

Un grupo de científicos sugiere que casi un tercio del millón de muertes por COVID-19 en Estados Unidos podría haberse evitado si un mayor número de personas hubiera optado por vacunarse. Aunque los no vacunados siguen constituyendo la mayoría de los casos de COVID-19 y de las hospitalizaciones relacionadas, el número de estadounidenses que dicen no vacunarse contra COVID-19 se ha mantenido estable durante casi un año. Uno de cada tres estados ha vacunado completamente a menos del 60% de su población elegible.

[LEA MÁS >](#)

20 de mayo de 2022

Algunas personas necesitan segundo refuerzo COVID-19 para considerarse al día

Todos los adultos de 50 años o más y todas las personas inmunodeprimidas de 12 años o más deben recibir una segunda dosis de refuerzo 4 meses después de su primer refuerzo. Las personas que recibieron la vacuna de J&J (Janssen) como serie primaria y primer refuerzo pueden recibir una segunda dosis de refuerzo ARNm 4 meses después de la primera. Actualmente, sólo estas tres poblaciones pueden recibir un segundo refuerzo.

[LEA MÁS >](#)

18 de mayo de 2022

Autoridades federales de salud advierten sobre incremento de casos de COVID-19

Cada día se producen casi 100,000 nuevas infecciones por COVID-19 en Estados Unidos. Los altos funcionarios de salud advirtieron que un tercio de los estadounidenses viven en comunidades que experimentan niveles progresivos de casos de coronavirus y de hospitalización. Instaron a la población a volver a tomar medidas de protección personal, incluido el uso de mascarillas. Este aumento se produce en el momento en que el país se adentra al fin de semana del Día de la Recordación, con sus grandes reuniones y el aumento de viajeros por el feriado.

[LEA MÁS >](#)



Américas es una organización centrada en la salud y el desarrollo que responde a las personas afectadas por la pobreza o desastres, con programas de salud, medicamentos, suministros médicos y ayuda de emergencia que cambian la vida.

Relieve de responsabilidad: Este proyecto fue financiado en su totalidad por un acuerdo de cooperación con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades con el número de subvención 6 NU50CK000588-02-02. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades son una agencia dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). El contenido de este recurso no representa necesariamente la política de los CDC o del HHS y no debe considerarse un respaldo del Gobierno Federal.